

<https://investor.theravance.com/news-releases/news-release-details/theravance-biopharma-inc-announces-results-study-0170-second>

2022-04-04

Theravance Biopharma, Inc. annonce les résultats de l'étude 0170, REDWOOD, une deuxième étude de phase 3 sur l'ampreloxétine, chez des patients atteints d'hypotension orthostatique neurogène symptomatique (nOH)

- *Les résultats de l'étude 0170 montrent un bénéfice chez les patients de l'étude atteints d'atrophie multi-systématisée (AMS)*
- *La société entame des discussions avec des partenaires stratégiques potentiels et planifie des interactions avec les autorités sanitaires pour accélérer l'utilisation de l'ampreloxétine comme option de traitement possible pour les patients atteints de nOH symptomatique*
- *La société reste concentrée sur les thérapies respiratoires, la création de valeur pour les actionnaires et réitère son intention d'avoir un flux de trésorerie durablement positif d'ici le second semestre de l'année*


DUBLIN, 4 avril 2022 /PRNewswire/ -- Theravance Biopharma, Inc. (« Theravance Biopharma » ou la « Société ») (NASDAQ : TBPH) a annoncé aujourd'hui les résultats de la deuxième étude de phase 3, l'étude 0170 (n = 128 sur n = 154 prévus), évaluant la durabilité de l'effet clinique de l'ampreloxétine par rapport au placebo pour le traitement de la nOH symptomatique. **L'étude 0170 était une étude de phase 3 de 22 semaines comprenant une période en ouvert de 16 semaines suivie d'une période de retrait randomisée en double aveugle, contrôlée par placebo et de 6 semaines.** Le critère principal d'évaluation de l'échec du traitement à la semaine 6 de la période d'arrêt randomisée a été défini comme une aggravation de la question n° 1 de l'échelle d'évaluation des symptômes d'hypotension orthostatique (OHSA) et des scores d'impression globale de gravité du patient (PGI-S) de 1,0 point.

Le critère d'évaluation principal n'était pas statistiquement significatif pour la population globale de patients qui comprenait des patients atteints de la maladie de Parkinson (MP), d'une insuffisance autonome pure (PAF) et d'AMS (rapport de cotes = 0,6 ; valeur p = 0,196). L'odds ratio suggère que les patients recevant de l'ampreloxétine présentaient une réduction de 40 % du risque d'échec du traitement par rapport au placebo.

L'analyse des sous-groupes pré-spécifiés par type de maladie suggère que **le bénéfice observé chez les patients recevant de l'ampreloxétine était largement induit par les patients atteints d'AMS** (n = 40). Un rapport de cotes de 0,28 (IC à 95 % : 0,05 ; 1,22) a été observé chez les patients atteints d'AMS, indiquant une réduction de 72 % du risque d'échec du traitement avec l'ampreloxétine par rapport au placebo. **Le bénéfice pour les patients atteints d'AMS a été observé dans plusieurs critères d'évaluation, y compris le composite OHSA, le composite Orthostatic Hypotension Daily Activities Scale (OHDAS), le composite Orthostatic Hypotension Questionnaire (OHQ) et l'OHSA #1** (voir la figure ci-dessous).

Notamment, les patients retirés du groupe placebo ont présenté une diminution cliniquement pertinente de la pression artérielle en position debout ; il n'y a pas eu de diminution chez les patients restant sous

ampreloxétine. Bien que le même bénéfice n'ait pas été apparent chez les patients atteints de MP ou de PAF, la Société continue d'analyser les données pour mieux comprendre cette observation. Tout au long de l'étude, il n'y avait aucune indication d'aggravation de l'hypertension en décubitus dorsal sur la base d'une surveillance de 24 heures. Les données suggèrent que l'ampreloxétine a été bien tolérée et aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié



Questionnaire OHQ Scores composites et items individuels pour les patients MSA

"L'AMS est une maladie dévastatrice sans traitement de fond efficace. Il est urgent de traiter les patients atteints d'AMS souffrant de nOH en raison de l'impact sur la qualité de vie et de la charge extrême des soignants. L'ampreloxétine semble améliorer un domaine étroit, mais d'une importance cruciale, groupe de symptômes liés au contrôle de la pression artérielle, et avec le profil d'innocuité, peuvent représenter une thérapie potentielle pour les patients atteints d'AMS », a déclaré Roy Freeman, MBChB, professeur de neurologie, directeur du Centre pour les troubles nerveux autonomes et périphériques, Beth Israel Deaconess Medical Center, qui a participé à la conception et à l'interprétation de l'étude.

« Chez Theravance Biopharma, nous sommes guidés par les résultats des patients. Étant donné le besoin évident non satisfait des patients atteints d'AMS souffrant de nOH symptomatique, nous engageons des partenaires potentiels et planifions des interactions avec les autorités sanitaires pour déterminer une voie à suivre dans **l'espoir d'accélérer l'ampreloxétine comme option de traitement possible pour les personnes atteintes d'AMS** », a déclaré Rick E Winningham, président-directeur général de Theravance Biopharma. "Simultanément, nous réalisons notre business plan et restons disciplinés dans l'allocation du capital, maximisant la valeur pour les actionnaires et réaffirmons notre objectif d'avoir un flux de trésorerie durablement positif d'ici le second semestre de cette année."

À propos de l'étude de phase 3

L'étude 0170 (NCT03829657) était une étude de phase 3 de 22 semaines comprenant

- une période en ouvert de 16 semaines
- et une période de retrait randomisée en double aveugle, contrôlée par placebo et de 6 semaines. Le critère principal d'évaluation de l'échec du traitement à la semaine 6 a été défini comme une aggravation

de la question 1 de l'échelle d'évaluation des symptômes d'hypotension orthostatique (OHSA) et des scores d'impression globale de gravité du patient (PGI-S) de 1,0 point. Après que l'étude 0169 n'ait pas atteint son critère d'évaluation principal, la société a pris des mesures pour clôturer le programme clinique en cours, y compris l'étude 0170. L'étude a été recrutée à plus de 80 % (n = 128/154 prévus) malgré son arrêt précoce.

À propos de la nOH symptomatique

L'hypotension orthostatique neurogène (nOH) est une maladie rare définie comme une chute orthostatique soutenue de la pression artérielle systolique (PAS) \geq 20 mm Hg ou de la pression artérielle diastolique (PAD) \geq 10 mm Hg dans les trois minutes suivant la position debout. Les patients gravement atteints sont incapables de se tenir debout plus de quelques secondes en raison de leur diminution de la pression artérielle, entraînant une hypoperfusion cérébrale et une syncope. Condition aggravante, la nOH entraîne une série de symptômes, notamment des étourdissements, des évanouissements, de la fatigue, une vision floue, de la faiblesse, des problèmes de concentration et des douleurs à la tête et au cou. La nOH est causée par un dysfonctionnement du système nerveux autonome et est associée à plusieurs affections médicales sous-jacentes, notamment l'atrophie multi-systématisée (AMS), l'insuffisance autonome pure (PAF) et la maladie de Parkinson (PD).

À propos de l'atrophie multi-systématisée (AMS)

L'AMS (anciennement syndrome de Shy-Drager) est une maladie neurodégénérative rare, rapidement progressive, gravement invalidante et mortelle qui entraîne la mort dans un délai médian de sept à 10 ans après l'apparition des symptômes. L'AMS partage de nombreux symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson, tels que des mouvements lents, des muscles rigides et un mauvais équilibre. Le principal signe d'atrophie multi-systématisée est l'hypotension posturale (orthostatique). Une personne atteinte d'AMS peut également développer des niveaux de pression artérielle dangereusement élevés en position couchée (hypertension en décubitus dorsal). D'autres manifestations comprennent : un dysfonctionnement urinaire et intestinal, la constipation, l'incontinence, des anomalies de la transpiration, des troubles du sommeil, un dysfonctionnement sexuel, des problèmes cardiovasculaires et des problèmes psychiatriques. Les causes de décès les plus fréquentes dans l'AMS sont les infections et les complications cardio-pulmonaires. Actuellement, les patients atteints d'AMS ne reçoivent que des thérapies symptomatiques et palliatives car il n'existe aucun traitement modificateur de la maladie ni aucun remède.

À propos de l'ampreloxétine

L'ampreloxétine (TD-9855) est un inhibiteur expérimental du recaptage de la norépinéphrine oral, puissant, à action prolongée, découvert par Theravance Biopharma, en cours de développement pour le traitement de l'hypotension orthostatique neurogène symptomatique avec protection par brevet jusqu'en 2037 aux États-Unis . En plus du programme clinique de phase 3, Theravance Biopharma a mené un programme complet de pharmacologie non clinique et clinique. L'ampreloxétine a été évaluée chez plus de 800 patients dans le cadre d'études cliniques sur la fibromyalgie, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et la nOH symptomatique.


À propos de Theravance Biopharma

Theravance Biopharma, Inc. est une société biopharmaceutique qui se concentre principalement sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments respiratoires. Son objectif principal est de créer des médicaments qui contribuent à améliorer la vie des patients souffrant de maladies respiratoires.

Dans la poursuite de son objectif, Theravance Biopharma s'appuie sur des décennies d'expertise respiratoire pour découvrir et développer des médicaments transformationnels qui font la différence. Ces efforts ont conduit au développement de la solution pour inhalation YUPELRI® (revefenacin) approuvée par la FDA, indiquée pour le traitement d'entretien des patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Son pipeline respiratoire de programmes découverts en interne vise à répondre aux besoins respiratoires importants des patients.

Theravance Biopharma a un intérêt économique dans les paiements futurs potentiels de Glaxo Group Limited ou de l'une de ses sociétés affiliées (GSK) en vertu de ses accords avec Innoviva, Inc. relatifs à certains programmes, y compris TRELEGY.


OHQ questionnaire composite scores and individual items for MSA patients



Overall safety summary Study 0170


16-week open-label

6-week double blind RWD


 **Ampreloxetine 10 mg (n=200)**

- 53% TEAEs (n=105), majority mild to moderate
- 8% SAEs (n=16), none reported as related to ampreloxetine
 - 5 deaths
- 3 AEs of special interest:
 - Supine hypertension (n=1)
 - Myocardial infarction (n=1)
 - Atrial arrhythmia (n=1)

Baseline
Randomization

 **Ampreloxetine 10 mg (n=64)**

- SAEs: 2 of 4 events reported as study drug-related
 - 2 Deaths (1 unrelated, 1 unknown and imputed as related)

 **Placebo (n=64)**

- SAEs: 1 of 2 events was reported as study drug related

- TEAEs were similar for ampreloxetine and placebo groups, majority were mild to moderate
- No AEs of special interest
- No clinically significant difference between treatment groups in:
 - Laboratory values
 - ECG
 - Ambulatory blood pressure monitoring
 - Vital signs

Placebo, n=	33	33	33	31	31				20	19	20	18		
Ampreloxetine, n=	34	33	33	33	32	64	60	51	44	42	20	17	19	20

Theravance Biopharma, Inc. Announces Results from Study 0170, a Second Phase 3 Study of Ampreloxetine, in Patients with Symptomatic Neurogenic Orthostatic Hypotension (nOH)

April 4, 2022 at 4:05 PM EDT

[PDF Version](#)


- *Results from Study 0170 show a benefit in study patients with multiple system atrophy (MSA)*
- *Company beginning discussions with potential strategic partners and planning health authority interactions to expedite ampreloxetine as a possible treatment option for patients with symptomatic nOH*
- *Company remains focused on respiratory therapeutics, value creation for shareholders and reiterates plan to be sustainably cash-flow positive by the second half of the year*

DUBLIN, April 4, 2022 /PRNewswire/ -- Theravance Biopharma, Inc. ("Theravance Biopharma" or the "Company") (NASDAQ: TBPH) today announced results from the second Phase 3 study, Study 0170 (n=128 out of n=154 planned), assessing the durability of clinical effect of ampreloxetine compared to

placebo for the treatment of symptomatic nOH. Study 0170 was a 22-week Phase 3 study comprised of a 16-week open-label period followed by a 6-week double-blind, placebo-controlled, randomized withdrawal period. The primary endpoint of treatment failure at week 6 of the randomized withdrawal period was defined as a worsening of both Orthostatic Hypotension Symptom Assessment Scale (OHSA) question #1 and Patient Global Impression of Severity (PGI-S) scores by 1.0 point.

The primary endpoint was not statistically significant for the overall population of patients which included patients with Parkinson's disease (PD), pure autonomic failure (PAF) and MSA (odds ratio=0.6; p-value=0.196). The odds ratio suggests that patients receiving ampreloxetine had a 40% reduction in the odds of treatment failure compared to placebo.

The pre-specified subgroup analysis by disease type suggests the benefit seen in patients receiving ampreloxetine was largely driven by MSA patients (n=40). An odds ratio of 0.28 (95% CI: 0.05, 1.22) was observed in MSA patients indicating a 72% reduction in the odds of treatment failure with ampreloxetine compared to placebo. The benefit to MSA patients was observed in multiple endpoints including OHSA composite, Orthostatic Hypotension Daily Activities Scale (OHDAS) composite, Orthostatic Hypotension Questionnaire (OHQ) composite and OHSA #1 (see figure below). Notably, patients withdrawn to placebo had a clinically relevant decrease in standing blood pressure; there was no decrease for patients remaining on ampreloxetine. While the same benefit was not apparent in patients with PD or PAF, the Company continues to analyze the data to better understand this observation. Throughout the study, there was no indication of worsening of supine hypertension based on 24-hour monitoring. Data suggest that ampreloxetine was well-tolerated and no new safety signals were identified.



OHQ questionnaire Composite scores and individual items for MSA patients

"MSA is a devastating and debilitating disease with no effective disease modifying treatment. There is an urgency to treat MSA patients suffering with nOH due to the impact on quality of life and the extreme caregiver burden. Ampreloxetine appears to improve a narrow, but critically important group of symptoms related to blood pressure control, and along with the safety profile, may represent a potential

therapy for MSA patients," said Roy Freeman, MBChB, Professor of Neurology, Director, Center for Autonomic and Peripheral Nerve Disorders, Beth Israel Deaconess Medical Center, who assisted in the design and interpretation of the study.

"At Theravance Biopharma, we are guided by patient outcomes. Given the clear unmet need for MSA patients suffering from symptomatic nOH, we are engaging potential partners and planning health authority interactions to determine a path forward in hopes of expediting ampreloxetine as a possible treatment option for people with MSA," said Rick E Winningham, Chief Executive Officer, Theravance Biopharma. *"Concurrently, we are executing against our business plan and remain disciplined in capital allocation, maximizing shareholder value and re-iterate our goal to be sustainably cash-flow positive by the second half of this year."*

Disclosure: Dr. Freeman is a consultant serving as an advisor for drug development and clinical trial design for Theravance Biopharma.

[Study 0170 \(REDWOOD\) Ampreloxetine Phase 3 Results](#)

About the Phase 3 Study

Study 0170 ([NCT03829657](#)) was a 22-week Phase 3 study comprised of a 16-week open-label period and a 6-week double-blind, placebo-controlled, randomized withdrawal period. The primary endpoint of treatment failure at week 6 was defined as a worsening of both Orthostatic Hypotension Symptom Assessment Scale (OHSA) question #1 and Patient Global Impression of Severity (PGI-S) scores by 1.0 point. After Study 0169 did not meet its primary endpoint, the Company took actions to close out the ongoing clinical program including Study 0170. The study was more than 80% enrolled (n=128/154 planned) despite stopping early.

About Symptomatic nOH

Neurogenic orthostatic hypotension (nOH) is a rare disorder defined as a sustained orthostatic fall in systolic blood pressure (SBP) of ≥ 20 mm Hg or diastolic blood pressure (DBP) of ≥ 10 mm Hg within three minutes of standing. Severely affected patients are unable to stand for more than a few seconds because of their decrease in blood pressure, leading to cerebral hypoperfusion and syncope. A debilitating condition, nOH results in a range of symptoms including dizziness, lightheadedness, fainting, fatigue, blurry vision, weakness, trouble concentrating, and head and neck pain. nOH is caused by autonomic nervous system malfunction and is associated with several underlying medical conditions including multiple system atrophy (MSA), pure autonomic failure (PAF), and Parkinson's disease (PD).

About Multiple System Atrophy (MSA)

MSA (formerly Shy-Drager syndrome) is a rare, rapidly progressive, severely debilitating, and fatal neurodegenerative disease that leads to death within a median of seven to 10 years after the onset of symptoms. MSA shares many Parkinson's disease-like symptoms, such as slow movement, rigid muscles and poor balance. The primary sign of multiple system atrophy is postural (orthostatic) hypotension. A person with MSA can also develop dangerously high blood pressure levels while lying down (supine hypertension). Other manifestations include: urinary and bowel dysfunction, constipation, incontinence, sweating abnormalities, sleep disorders, sexual dysfunction, cardiovascular problems and psychiatric problems. The most common causes of death in MSA are infection and cardiopulmonary

complications. Currently, MSA patients receive only symptomatic and palliative therapies as there are no disease-modifying treatments and no cure.

About Ampreloxetine

Ampreloxetine (TD-9855) is an investigational, Theravance Biopharma-discovered, potent, long-acting, oral, once-daily norepinephrine reuptake inhibitor in development for the treatment of symptomatic neurogenic orthostatic hypotension (nOH) with patent protection until 2037 in the US. In addition to the Phase 3 clinical program, Theravance Biopharma has conducted a comprehensive non-clinical and clinical pharmacology program. Ampreloxetine has been evaluated in over 800 patients in clinical studies of fibromyalgia, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and symptomatic nOH.

About Theravance Biopharma

Theravance Biopharma, Inc. is a biopharmaceutical company primarily focused on the discovery, development and commercialization of respiratory medicines. Its core purpose is to create medicines that help improve the lives of patients suffering from respiratory illness.

In pursuit of its purpose, Theravance Biopharma leverages decades of respiratory expertise to discover and develop transformational medicines that make a difference. These efforts have led to the development of FDA-approved YUPELRI® (revefenacin) inhalation solution indicated for the maintenance treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Its respiratory pipeline of internally discovered programs is targeted to address significant patient respiratory needs.

Theravance Biopharma has an economic interest in potential future payments from Glaxo Group Limited or one of its affiliates (GSK) pursuant to its agreements with Innoviva, Inc. relating to certain programs, including TRELEGY.

For more information, please visit www.theravance.com.

THERAVANCE BIOPHARMA®, THERAVANCE®, and the Cross/Star logo are registered trademarks of the Theravance Biopharma group of companies (in the US and certain other countries).

YUPELRI® is a registered trademark of Mylan Specialty L.P., a Viatrix Company. Trademarks, trade names or service marks of other companies appearing on this press release are the property of their respective owners.

Forward-Looking Statements

This press release contains certain "forward-looking" statements as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding, among other things, statements relating to goals, plans, objectives, expectations and future events. Theravance Biopharma intends such forward-looking statements to be covered by the safe harbor provisions for forward-looking statements contained in Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934 and the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Examples of such statements include statements relating to: the Company's goals, designs, strategies, plans and objectives, ability to provide value to shareholders, the Company's regulatory strategies, the potential characteristics, benefits and mechanisms of action of the Company's product and product candidates, the Company's expectations for product candidates through development and

the market for products being commercialized, the Company's expectations regarding its allocation of resources, potential regulatory actions and commercialization, product sales or profit share revenue and the Company's expectations for its expenses, excluding share-based compensation and other financial results. These statements are based on the current estimates and assumptions of the management of Theravance Biopharma as of the date of the press release and are subject to risks, uncertainties, changes in circumstances, assumptions and other factors that may cause the actual results of Theravance Biopharma to be materially different from those reflected in the forward-looking statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from those indicated by such forward-looking statements include, among others, risks related to: additional future analysis of the data resulting from our clinical trial(s), the potential that results from clinical or non-clinical studies indicate the Company's compounds, products or product candidates are unsafe, ineffective or not differentiated, risks of decisions from regulatory authorities that are unfavorable to the Company, delays or failure to achieve and maintain regulatory approvals for product candidates, risks of collaborating with or relying on third parties to discover, develop, manufacture and commercialize products, and ability to retain key personnel, the impact of the Company's restructuring actions on its employees, partners and others. In addition, while we expect the effects of COVID-19 to continue to adversely impact our business operations and financial results, the extent of the impact on our ability to generate revenue from YUPELRI® (revefenacin), our clinical development programs, and the value of and market for our ordinary shares, will depend on future developments that are highly uncertain and cannot be predicted with confidence at this time. Other risks affecting Theravance Biopharma are in the Company's Form 10-K filed with the SEC on February 28, 2022, and other periodic reports filed with the SEC. In addition to the risks described above and in Theravance Biopharma's filings with the SEC, other unknown or unpredictable factors also could affect Theravance Biopharma's results. No forward-looking statements can be guaranteed, and actual results may differ materially from such statements. Given these uncertainties, you should not place undue reliance on these forward-looking statements. Theravance Biopharma assumes no obligation to update its forward-looking statements on account of new information, future events or otherwise, except as required by law.

Contact: Gail B. Cohen
Corporate Communications / 917-214-6603

View original content to download multimedia: <https://www.prnewswire.com/news-releases/theravance-biopharma-inc-announces-results-from-study-0170-a-second-phase-3-study-of-amprelosetine-in-patients-with-symptomatic-neurogenic-orthostatic-hypotension-noh-301517024.html>

SOURCE Theravance Biopharma, Inc.